

CONGRESUL NAȚIONAL DE CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE PEDIATRICĂ

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE PEDIATRICĂ

CAIET DE REZUMATE



CONSTANȚA
25 - 27 SEPTEMBRIE
1997

6. Subluxația inveterată atlanto-axială la copii

Autori: Nicolae N. Șavga

Instituția: Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului

Rezumat: Au fost examinați și tratați 158 copii cu semne clinice și radiologice de subluxație atlanto-axială. Vârsta copiilor a fost de 6-15 ani, 113 (71%)- fete și 45 (28%)- băieți. Au predominat acuza de caracter angiovegetativ : cefalee 145 (92%); vertige 129 (83%); voma la înălțimea accesului de cefalee a fost remarcată la 51 (33%); grețuri la 37 (23%); cordialgii- 98 (62%); hemoptizii 17 (11%); sindrom "drop-atac"-8; sincope-6 (3%); paretezii ale membrelor superioare și centurii scapulare-11 (6%); iritabilitate, dereglări de memorie-23 (13%). Pentru aprecierea eficacității diferitor metode de tratament ortopedic subluxații inveterate atlanto-axiale noi am efectuat analiza comparativă de tratament a bolnavilor 105 (67%) grupa 1 cărora li s-a efectuat reducerea după Richet-Hueter a subluxației, cu grupa de bolnavi tratați cu

căpăstrul Glison- 53 (23%)- grupa 2. Componența grupelor după vârstă și sex au fost identice. Bazându-ne pe datele clinice - în grupa 1-89 (91%), în grupa 2-6 (11%) : satisfăcătoare - dispariția parțială a simptomelor clinice în grupa 1-10 (9,5%), în grupa 2-9 (16%) : nesatisfăcătoare - fără efect curativ în grupa 1-6 (6%), în grupa 2-38 (71%). Complicații nu au fost survenite. Ce ne permite ca metodică pe Richet-Hueter mai eficace în tratamentul subluxației inveterate atlanto-axiale.